

التحليل الزمني الفسلجي لبعض المتغيرات الفسلجية والبدنية لدى لاعبات كرة قدم الصالات على الصعيد الدولي
أ.د. احمد عبد الغني طه ، أ.د. فالح جعاز شلش ، م.م. شمال حمزة حمد
العراق. جامعة صلاح الدين -اربيل. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
Faleh Jaaz_45@yahoo.com

الملخص

تعد المعلومات التي يوفرها تحليل البرامج ومواصفات وانجازات لاعبي كرة الصالات محاولة لاستقاء بيانات موضوعية فسيولوجية لبناء المنهاج التدريبي لفعالية كرة قدم الصالات من أكثر من مصدر منها نظري ومنها عملي من واقع الحال لذا تمثل معظم الدراسات التي استخدمت التحليل الى التخصصية في طبيعتها، وتركز على خصائص فعالية معينة بحد ذاتها مثل فعالية كرة القدم أو الكرة الطائرة او السكواش او كرة السلة او الدرجات او المبارزة، اما على صعيد كرة قدم الصالات ولعينة الاناث وحسب اطلاع الباحثون فإن التحليل الزمني الفسلجي لم يلقى الاهمية من الباحثين ، اذ لم يطبع الباحثون على دراسة من هذا النوع. بل كانت الدراسات على أساس تحليل المسافات المقطوعة .
لذا تكمن أهمية ومشكلة الدراسة الحالية في توظيف التحليل الفسلجي المعتمد على التقنيات الحديثة لتحليل زمن الاداءات الحركية والخروج بمعلومات تخدم باحثي ومدربي كرة قدم الصالات للإناث،
ويعتقد الباحثون ان مثل هذه المعلومات ستسمهم في التحكم بدرجة الحمل التدريبي لهذه الفئة وما لذلك من انعكاس من شأنه تطوير الناحية البدنية.

وأهداف البحث تتركز للكشف عن شدد وتكرارات أنواع الاداء المتضمنة لمباريات كرة قدم الصالات العالمية فئة الإناث وماماهية أنظمة الطاقة المسيطرة وعناصر اللياقة البدنية بوساطة التحليل الزمني الفسلجي وكذلك تحليل محتوى المصادر الفسلجية الخاصة بهذه الفعالية.

استخدم الباحثون بدراساتهم المنهج التجاري (التحليلي) لملاءنته وطبيعة البحث اما عينة الدراسة شملت اللاعبات البرازيليات المشاركات في بطولة جامعات العالم لعام 2016 ضد المنتخب البرتغالي في مباراة نصف النهائي علما ان العينة تمثل أيضا المنتخب الوطني للبرازيل، واهم الاستنتاجات تعد التي توصل اليها الباحثون ان فعالية كرة قدم الصالات على المستوى الدولي او الاحترافي لفئة الإناث فعالية مرتفعة الشدة متقطعة العمل تعتمد على تبادل عمل النظمتين اللاهوائي والهواي واوصى الباحثون الاخذ في الاعتبار النظمتين الفوسفاجيني والهواي عند تقييم وتطوير لاعبوا كرة قدم الصالات فئة الإناث.

الكلمات المفتاحية: التحليل الزمني الفسلجي ، لاعبات ، كرة قدم

Physiological time analysis of some physiological and physical variables among football halls female players on the international level

Prof.Dr. Ahmed Abdel-Ghani Taha, Prof. Dr. Faleh Jaaz Shalash, Assistant Lect. Shamal Hamza Hamad

Iraq. Salah al-Din University - Erbil. College of Physical Education and Sports Science
Faleh Jaaz_45@yahoo.com

Abstract

The information provided by program analysis, specifications and achievements of Football hall female players is an attempt to extract objective, physiological data for building the training curriculum for Football halls effectiveness from more than one source, including theoretical and practical, real aspects ,so most studies that have used the analysis tend to be specialized in their nature, and focus on certain effective characteristics by itself, such as football, volleyball, squash, basketball, motorbikes , or fencing, either on the level of football halls for the female sample. According to the researchers 'knowledge, the temporal and physiological analysis did not get attention from the researchers, as the researchers haven't investigated a study of this nature. Rather, the studies were based on analyzing the distances covered.

Therefore, the research significance and problem of the current study lie in employing a physiological analysis based on modern techniques to analyze the time of kinetic performances and coming up with information that serves researchers and coaches of Football halls among female players. Researchers believe that such information will contribute to controlling the degree of training load for this group and for this reflection that would develop the Physical aspect.

The research aims to focus on detecting the stresses and repetitions of the types of performance that are included in the global football halls matches, female category, what are the dominant energy systems and fitness elements by physiological time analysis, as well as analyzing the content of the physical sources for this event.

In their study, the researchers used the experimental (analytical) approach due to its suitability for the nature of the research. As for the study sample, the Brazilian players participating in the 2016 World Universities Championship against the Portuguese national team in the semi-final match, knowing that the sample also represents the national team of Brazil. The researchers concluded that football halls at the international or professional level for the female category provided high-intensity, intermittent efficacy, dependent on the exchange of work of the anaerobic and antenna systems. The researchers recommended taking into account the phosphogenic and antenna systems when evaluating and developing football halls female players.

Keywords: physiological time analysis, female players, football

-1- المقدمة:

تعد المعلومات التي يوفرها تحليل البرامج ومواصفات وانجازات لاعبي كرة الصالات محاولة لاستقاء بيانات موضوعية فسيولوجية لبناء المنهاج التدريبي لفعالية كرة قدم الصالات مشتقاً أكثر من مصدر منها نظري ومنها عملي من واقع الحال وتميل معظم الدراسات التي استخدمت التحليل إلى التخصصية في طبيعتها، وتركز على خصائص فعالية معينة بحد ذاتها مثل فعالية كرة القدم أو الكرة الطائرة أو السكواش أو كرة السلة أو الدرجات أو المبارزة.

اما على صعيد كرة قدم الصالات ولعينة الإناث وحسب اطلاع الباحثون فإن التحليل الزمني الفسلجي لم يلقى الاهمية من الباحثين اذ لم يطلع الباحثون على دراسة من هذا النوع بل كانت الدراسات على أساس تحليل المسافات المقطوعة.

لذا تكمن أهمية ومشكلة الدراسة الحالية في توظيف التحليل الفسلجي المعتمد على التقنيات الحديثة لتحليل زمن الاداءات الحركية والخروج بمعلومات تخدم باحثي ومدربى كرة قدم الصالات للإناث ويعتقد الباحثون ان مثل هذه المعلومات ستسمح لهم في التحكم بدرجة الحمل التدريبي لهذه الفئة وما لذلك من انعكاس من شأنه تطوير الناحية البدنية. ويهدف البحث الى :

- الكشف عن شدد وتكرارات أنواع الأداء المتضمنة لمباريات كرة قدم الصالات العالمية فئة الإناث وماماهية أنظمة الطاقة المسيطرة وعناصر اللياقة البدنية بوساطة التحليل الزمني الفسلجي وكذلك تحليل محتوى المصادر الفسلجية الخاصة بهذه الفعالية.

-2- إجراءات البحث:

2-1- منهج البحث: تم استخدام المنهاج التجريبي(التحليلي) لملاءمتها لطبيعة مشكلة البحث.

2-2- عينة البحث:

شملت عينة البحث اللاعبات البرازيليات المشاركات في بطولة جامعات العالم لعام 2016 ضد المنتخب البرتغالي في مباراة نصف النهائي علماً ان العينة تمثل أيضاً المنتخب الوطني للبرازيل.

2-3-1- وسائل جمع المعلومات:

- المصادر العربية والأجنبية.

- الاختبارات والقياسات.

- الطريقة التقنية (التحليل الفديوي)

2-3-2 الأجهزة والأدوات المستخدمة:

- برنامج كومبيوترى لتقطيع فديو (VEDIO EDITOR).
- جهاز حاسوب محمول نوع (HP).
- التحليل الزمني الفسلجي

تم استخدام البرنامج على الحاسوب نوع (VEDIO EDITOR) لعرض التقاط الفيديو لكرة قدم الصالات للإناث العالمية والمحليّة ويتضمن التحليل تسجيل الاداءات الحركية• كافة التي تحدث طوال المباراة من بدايتها الى نهايتها بوحدة قياس الثواني واجزائها وتم تقسيم التحليل على تسجيل ازمنة الاداءات كافة والتي هي بين صافرة الحكم (العب) وصافرة (قف) وتشمل الاداءات بالشدة العالية والاداءات بالشدة المتوسطة الى المنخفضة، ويتم تصنيف شدة الاداءات الحركية الى مرتفعة الشدة والى منخفضة الى متوسطة الشدة وذلك بالرجوع الى زمن وعدد وطبيعة الحركات التي يشتمل عليها هذا الاداء اذ عدت الاداءات الحركية مرتفعة الشدة واشتملت على اكبر عدد من الحركات في غضون اقل فترة زمنية مقارنة بالاداءات الاطول زمناً، يضاف الى ذلك خبرة المحلل وفرغت نتائج التحليل في استماره خاصة تعد لها هذا الغرض.

2-4 الوسائل الإحصائية:

- الوسط الحسابي.
- الانحراف المعياري.
- النسبة المئوية.
- عولجت البيانات الاحصائية باستخدام برنامج excel.

3- عرض ومناقشة عدد وزمن ونسبة التكرارات بشدد مختلفة لمباريات كرة قدم الصالات لفئة الإناث- المستوى الدولي

الجدول (1) يبيّن عدد وزمن ونسبة التكرارات بشدد مختلفة لمركز الوسط في مباريات كرة قدم الصالات لفئة النساء - المستوى الدولي

| المجموع | شدة خفيفة | شدة متوسطة | شدة عالية | وحدة القياس | الشدة |
|----------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| 408 | 122 | 202 | 84 | عدد | التكرارات |
| 100.00 | 29.90 | 49.51 | 20.59 | % | النسبة المئوية للتكرارات |
| 2956.711 | 1006.84 | 1585.441 | 364.43 | ثا | مجموع زمن التكرارات |
| | 8.25 | 7.85 | 4.34 | ثا | متوسط زمن التكرارات |
| | 10.33 | 3.94 | 2.49 | ثا | انحراف المعياري لزمن التكرارات |
| 100.00 | 34.05 | 53.62 | 12.33 | % | النسبة المئوية لزمن التكرارات |

الجدول (2) يبيّن عدد وزمن ونسبة التكرارات بشدد مختلفة لمركز المهاجم في مباريات كرة قدم الصالات لفئة الإناث - المستوى الدولي

| المجموع | شدة خفيفة | شدة متوسطة | شدة عالية | وحدة القياس | الشدة |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| 398 | 122 | 186 | 90 | عدد | التكرارات |
| 100.00 | 30.65 | 46.73 | 22.61 | % | النسبة المئوية للتكرارات |
| 2946.47 | 1218.68 | 1340.4 | 387.39 | ثا | مجموع زمن التكرارات |
| | 9.99 | 7.21 | 4.30 | ثا | متوسط زمن التكرارات |
| | 10.48 | 3.25 | 2.15 | ثا | انحراف المعياري لزمن التكرارات |
| 100.00 | 41.36 | 45.49 | 13.15 | % | النسبة المئوية لزمن التكرارات |

الجدول (3) يبين عدد و زمن و نسبة التكرارات بشدد مختلفة لمركز المدافع في مباريات كرة قدم الصالات لفئة الاناث - المستوى الدولي

| المجموع | شدة خفيفة | شدة متوسطة | شدة عالية | وحدة القياس | الشدة |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 399 | 109 | 234 | 56 | عدد | التكرارات |
| 100.00 | 27.32 | 58.65 | 14.04 | % | النسبة المئوية للتكرارات |
| 3106.34 | 1143.78 | 1670.87 | 291.69 | ثا | مجموع زمن التكرارات |
| | 10.49 | 7.14 | 5.21 | ثا | متوسط زمن التكرارات |
| | 11.85 | 4.21 | 2.57 | ثا | الانحراف المعياري لزمن التكرارات |
| 100.00 | 36.82 | 53.79 | 9.39 | % | النسبة المئوية لزمن التكرارات |

تبين الجداول (1,2,3) حالات التكرار في كل من الشدة العالية والمتوسطة والخفيفة والنسب المئوية لها كما توضح مجموع زمن هذه الحالات وأواسطها الحسابية وانحرافاتها المعيارية ونسبها المئوية عند تحليل لمباريات كرة قدم الصالات ذات المستوى العالمي لفئة الاناث.

ويشير(Brown, Miller, & Eason, 2006) متوسط زمن الحالات الى ان الاداءات الحركية المنفذة بالشدة العالية لكل من مراكز اللعب الثلاثة وقعت ضمن سيطرة النظام الفوسفاجيني ، هذه النتيجة بان النظام الفوسفاتي يعد نظام الطاقة المهيمن للأنشطة ذات الشدد العالية والتي تدوم لغاية 15 ثانية او اقل من ذلك ، هذه النتائج الى مدى سيطرة النظام الفوسفاجيني وماهية عناصر اللياقه البدنيه المتضمنه فيها وتشير ايضا الى ان الاداءات الحركية من هذا النوع تقع بحسب الاتحاد الكندي للتدريب ضمن مرحلة قمة القدرة للنظام الفوسفاجيني(أي صفر الى 5 ثانية).

(Brown . Miller. Eason . 2006 .p9)

ولا تعني قمة القدرة في هذا السياق الهيمنة المطلقة للنظام الفوسفاجيني على هذه الأنواع من الاداء بل تعني الهيمنة العظمى اذ يذكر (Fox, 1984) "انه يوجد اشتراك بسيط او يكاد لا ينكر لكل من النظائر الاخرين"

ونكون نسبة اسهام الانظمة الثلاثة هذه الأنواع من الاداء بحسب (Martin ,Lumden.1987) هي (85%) للنظام الفوسفاجيني و(10%) للنظام اللاكتاتي و(5%) للنظام الاوكسجيني علما ان النسب هذه معطاة لاداءات حركية مرتفعة الشدة لمدة اقصاها (5) ثانية.

ان قانون التبديل اللامحدود طوال مدة المباراة في كرة قدم الصالات للاعبات الملعب اللوائي تم تحليل لعبهن قد سمح لهن بتنفيذ انواع من الأداء الحركي عالية الشدة.

وتتفق هذا الدراسة مع (Dogramaci&Watsford.2006) ان نتائج النظام الفوسفاجيني أيضاً مع العديد من الدراسات في مجال كرة قدم الصالات التي اثبتت تحليلات ان كرة قدم الصالات عبارة عن أنواع من الاداء الانتقالى المتقطع عالية الشدة تتغير كل 3.38 ثانية.

وقد أشار (Barbero Alvarez.2008) واخرون الى حدوث ما متوسطة 8.6 اداء بالدقيقة الواحدة من اللعب مع شدد عالية كل 23 ثانية . وقد اشار كل من

(Dogramaci & Watsford,Barbero-Alvarez et al, Barbero A ' Ivarez & Castagna)

ان لاعب كرة قدم الصالات يظهر في المباراة التنافسية شدد عالية تشكل نسبتها (26%) من المسافة او الزمن الكلى، واظهرت الدراسات الحديثة ان لاعبي كرة الصالات المحترفون وفي اثناء المباريات الفعلية يمضون (5%) من زمن اللعب في الانطلاقات السريعة و(16%) في الركض بالشدة العالية ويتبين ان عناصر اللياقة البدنية المتطلبة ضمن النظام الفوسفاجيني لهذا النوع من الاداء وبحسب المصادر العلمية هي القوة العضلية والقدرة العضلية (القوة المميزة بالسرعة).

ويشير(Worthington.1980) متوسط زمن الحالات في الجداول الى السيطرة العظمى للنظام الاوكسجيني على أنواع الأداء الحركي المتوسط والخفيف الشدة وضمن حدود النسب الواردة في الجداول الخاصة بالمستوى العالمي ، وفي هذا الصدد اذ ان اثناء التمارين الخفيفة او المتوسطة الشدة يهيمن العمل الهوائي في تجهيز الطاقة وتكون متطلبات التمارين من الطاقة مساوية لاستهلاك الاوكسجين .

وتتفق نتيجة النظام الاوكسجيني مع دراسة(Barbero-A' Ivarez.2009) واخرون التي أظهرت ان استهلاك الاوكسجين القصوى يعد متغيراً بدنياً يعتمد على مستوى المنافسة في كرة قدم الصالات. واوصت الدراسة بلعب كرة قدم الصالات على المستوى الاحترافي عند قيم $60 \text{ ml.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ من اقصى استهلاك للأوكسجين.

ومع دراسة(Castagna, Barbero A, Barbero Alvarez et) واخرون التي عدت كرة قدم الصالات في الآونة الأخيرة فعالية تؤدى بشدد عالية متقطعة تعتمد بشكل كبير على النظام الهوائي. وينجز لاعبو كرة قدم الصالات الدوليون وبخاصة في اثناء المباريات الرسمية التنافسية والنزالات التدريبية متوسط شدد عمل تعادل (90%) من نبضهم القصوى و(75%) من استهلاك للأوكسجين لديهم، ويصل اعلى نبض لديهم في اثناء المباراة الى (98%) من قيمته القصوى واعلى اوكسجين الى (99%) من قيمته القصوى.

لقد ساعدت أنواع الأداء الخيفي إلى متوسط الشدة التي تخللت الأداء بالشدة العالية في تحمل التعب طوال مدة المباراة إذ يشير كل من (Gisolfi, 1996) وآخرون إلى أن التمارين بشدة بين (50-65%) من أقصى استهلاك للأوكسجين للرياضيين مثل تمرينات الهرولة ومرجحة الجسم تسريع عند مقارنتها بظرف الراحة الكاملة في إعادة تخزين الطاقة المستفادة وتسريع كذلك في إزالة أي تراكم لحمض اللكتات الذي يحتمل أنه نتج خلال فترة التمارين.

كما ويشير متوسط زمن الحالات بالشدة العالية والمتوسطة والخفيفة إلى عدم ظهور أي نوع من الأداء الحركي يقع ضمن هيمنة نظام حامض اللكتات في أي من الشد، وتتفق هذه النتيجة مع (Brown, Castagna) وآخرون الذي يذكر أن هيمنة نظام حامض اللكتات تكون في تمارين مرتفعة الشدة مدتها الزمنية أقل من دققتين كما لم تسجل الدراسات قيم عالية لمستوى اللكتات للاعب كرة قدم الصالات.

يتبيّن من جميع ما سبق أن طبيعة مساهمة وسيطرة أنظمة الطاقة الثلاثة الوارد ذكرها هي من نوع الفوسفاجيني - الهوائي التبادلي إذ تكون فعالية كرة قدم الصالات لفئة الإناث من نوع الفوسفاجيني فيما يخص أنواع الأداء مرتفع الشدة كالانطلاق باتجاه الكرة والهجمات السريعة والقفز لنطح الكرة وما شابه ذلك وبنسبة (20.5%) لمركز الوسط و(22.61%) لمركز المهاجم و(14.04%) لمركز المدافع، وتعد فعالية كرة قدم الصالات لفئة الإناث هوائية في تجهيز الطاقة عند أنواع الأداء متوسط إلى الخيف الشدة عندما تكون الاعبة بعيدة عن موقع الالتحام بلاعبات الخصم أو في اثناء الهرولة الخيفية أو المشي وما شابه ذلك وبنسبة (49.51%) و(49.90%) حسب التوالي لمركز الوسط وبنسبة (30.65%) و (46.73%) لمركز المهاجم وبنسبة (58.65%) و (27.32%) لمركز المدافع. ويؤكد (Fox, 1984) في هذا الخصوص أن فعاليات مثل كرة السلة والمبارزة والتنس والطائرة وكرة اليد رغم أنها تستمر لدقائق عديدة ، الا ان المهارات او الأداء فيها يعد بحد ذاته لا هوائيا والى حد بعيد لذا لا تمتلك فعاليات بهذه عنصرا هوائيا فحسب بل وعنصرا لا هوائيا ايضا .

4- الاستنتاجات والتوصيات:

1-4 الاستنتاجات:

- تعد فعالية كرة قدم الصالات على المستوى الدولي او الاحترافي لفئة الإناث فعالية مرتفعة الشدة متقطعة العمل تعتمد على تبادل عمل النظمتين اللاهوائي والهوائي.

2- التوصيات:

- الالذ في الاعتبار النظمتين الفوسفاجيني والهوائي عند تقييم وتطوير لاعبوا كرة قدم الصالات فئة الإناث.

المصادر

- اسماعيل ، م.هـ. (2013). منهاج تدريبي مقترن على وفق التحليل الزمني الفسلجي للاداءات الحركية في سلاح الشيش وتأثيره في بعض المتغيرات الوظيفية والمهارية. جامعة صلاح الدين.
- Bangsbo J, Mohr M, & Krstrup P. (2006). Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. *Journal of Sports Science*, 24(7), 665–677.
- Barbero-A' lvarez, J., D'Ottavio, S., Granda Vera, J., & Castagna, C. (2009). Aerobic fitness in futsal players of different competitive level. *J Strength Cond Res*, (23), 2163–2166.
- Barbero-Alvarez, J., Soto, V., Barbero-Alvarez, V., & Granda-Vera, J. (2008). Match analysis and heart rate of futsal players during competition. *J Sports Sci*, (26), 63–73.
- Barbero A ' lvarez, J., & Castagna, C. (2007). Activity patterns in professional futsal players using global position tracking system. *J Sports Sci Med*, (6(Suppl 10)), 208.
- Barbero Alvarez, J., Soto Hermoso, V., & Granda Vera, J. (2004). Effort profiling during indoor soccer competition. *J Sports Sci*, (22), 500–501.
- Brown, S. P., Miller, W., & Eason, J. (2006). *Exercise physiology : basis of human movement in health and disease*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Castagna, C., D'Ottavio, S., Vera, J., & Alvarez, J. (2009). Match demands of professional Futsal: A case study. *J Sci Med Sport*, (12), 490–494.
- Castagna, C., Impellizzeri, F., Chamari, K., Carlomagno, D., & Rampinini, E. (2006). Aerobic fitness and yo-yo continuous and intermittent tests performances in soccer players: A correlation study. *J Strength Cond Res*, (20), 320–325.
- Coaching Theory level 3. (1986). Coaching Association of Canada.
- Dog' ramaci, S., & Watsford, M. (2006). A comparison of two different methods for time-motion analysis in team sports. *Int J Perf Anal Sport*, (6).
- Draper, N., & Hodgson, C. (2008). *Adventure sport physiology*. Wiley-Blackwell.

- Fox, E. . (1984). Sports Physiology. Philadelphia: W.B.Saunders Co.
- Gisolfi, C. Robinson, S. and Turrel, E. S. (1996). Effects of Aerobic Work Performed During Recovery From Exhausting Work. *J. Appl. Physiol.*
- Goddard, D., & Newmann, U. (1993). Performance rock climbing. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books.
- Hague, D., & Hunter, D. (2006). The self coached climber. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books.
- Martin, G., & Lumden, J. . (1987). Coaching, An Effective Behvioral Approach. Times Mirror, Mosby College Publishing.
- Padilla, S., Mukikta, I., Orbananos, J., & Angulo, F. (2000). Exercise intensity during competition time trials in professional road cycling. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 32(4), 850–856.
- Vučković, G., Dežman, B., Erčulj, B., Kovačić, S., & Perš, J. (2002). Computer tracking of players at squash matches. *Acta Kinesiol. Univ. Tartu*, 7, 2016–2220.
- Worthington, E. (1980). Teaching Soccer skill (2nd ed.). London: Lepus books.